

په بدن کې د سرپو خوندي کچه نشته. کېدای شي ماشوم ته سرپ زیان ورسوي، اما لا هم روغ ښکاره شي. سرپ کولای شي د یوه ماشوم ودي، چلند او د زده کړې وړتیا ته زیان ورسوي. یوازینی لار چې پوه شئ ستاسو ماشوم د سرپو له خطر سره مخ دی او که نه، هغه د وینې معاینه کول دي.

لومړی د ماشوم د وینې مویرګي تست ترسره کېږي - له گوتې، پونډې یا پښې څخه لږه اندازه وینه اخیستل کېږي - ماشوم به په 1 کلنۍ او 2 کلنۍ کې لیدني ترسره کړي.

که چېرته ستاسو د ماشوم په وینه کې سرپ وموندل شي، نو کېدای شي چې هغوی نظارت ته اړتیا ولري یا کېدای شي اړتیا وي چې پایله یو ځل بیا له وریدي معاینې سره وکتل شي. په دغه معاینه کې د ورید وینه کارول کېږي (ډېری وخت له مټ څخه اخیستل کېږي). د وریدي معاینې پایله ډېره کره ده.

تاسو څه کولای شئ؟

- ستاسو د ماشوم د سرپو معاینه لومړنی گام دی. تاسو دا کار ترسره کړ!
- که چېرته ستاسو د ماشوم کچه $3.5 \mu\text{g}/\text{dL}$ (مایکرو گرامه په هر ډېسي لیټر) کې یا تر دې لوړه وي، نو وریدي معاینه مهالوېش کړئ.
- اړینه نه ده چې ستاسو د ماشوم د سرپو کچه څومره ده، دا زده کړئ چې خپل ماشوم د سرپو له خطر سره له مخ کېدو څخه څه ډول وساتئ. healthvermont.gov/lead ته مراجعه وکړئ یا د 802-863-7220 او یا 800-439-8550 شمېرې له لارې د سالمو کورونو د سرپو له خطر څخه د مخنیوي له پروگرام سره اړیکه ونیسئ.

د ایالتی قانون
غوښتنه ده چې د
وېرمونټ د ټولو
ماشومانو د سرپو
معاینه په 1 کلنۍ بیا
په 2 کلنۍ کې ترسره
شي

د سرپو د مویرګي وینې د معاینې پایله	د وینې وریدي معاینه څه وخت تایید کړو
سرپ نه دي موندل شوي (DL)	تایید ته اړتیا نشته. ستاسو د ماشوم په وینه کې سرپ و نه موندل شول.
DL - $3.4 \mu\text{g}/\text{dL}$	په راتلونکو 6 میاشتو کې یې له بلي معاینې سره نظارت وکړئ. ستاسو د ماشوم په وینه کې ډېره کمه اندازه سرپ موجود دي. د سرپو پر سرچینو بیاکتنه وکړئ تر څو د ماشوم د سرپو کچه لوړېدو ته پرېږدئ.
$9 - 3.5 \mu\text{g}/\text{dL}$	له 1 میاشتې څخه تر 3 میاشتو پورې. که چېرته تایید شي، نو ستاسو ماشوم د نورو ماشومانو په پرتله ډېر سرپ لري. د سرپو د سرچینو د کمولو لپاره گامونه پورته کړئ. د روغتیا ریاست به له تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو د سرپو د سرچینو په موندلو کې درسه مرسته وکړي.
$10 - 44 \mu\text{g}/\text{dL}$	له 2 اونيو څخه تر 1 میاشتې پورې. که تایید شي، نو ستاسو د ماشوم د سرپو کچه لوړه ده. تاسو او ستاسو ډاکټر باید په بیره اقدام وکړي تر څو د سرپو سرچیني را کمي کړي او ستاسو د ماشوم پر غذايي رژیم، ودي او پراختیا بحث وکړئ. د روغتیا ریاست کولای شي ستاسو له کور څخه لیدنه وکړي تر څو له تاسو سره مرسته وکړي چې ومومي سرپ مو له کوم ځای څخه راځي.
$45 - 59 \mu\text{g}/\text{dL}$	که تایید شي، نو ستاسو ماشوم به ژر تر ژره طبي درملني ته اړتیا ولري. له ډاکټر سره مشوره وکړئ او ژر تر ژره د سرپو سرچیني را کمي کړئ.
$+60 \mu\text{g}/\text{dL}$	د روغتیا ریاست کولای شي ستاسو له کور څخه لیدنه وکړي تر څو له تاسو سره مرسته وکړي چې ومومي سرپ مو له کوم ځای څخه راځي.
هر څومره چې د مویرګي معاینې پایله لوړه وي، هماغومره له وریدي معاینې سره تاییدي ته بېرني اړتیا ده.	
ستاسو د ماشوم د معاینې پایله $\mu\text{g}/\text{dL}$ _____ نېټه _____	

په وېرمونټ کې، د سرپو له امله ډېری رامنځ ته کېدونکي مسمومتیاوې د سرپو د هغو کوچنیو ذرو له تېرولو څخه رامنځ ته کېږي چې په سترگو نه لیدل کېږي او د ډېوال د رنگ له پوست کولو او تورولو څخه پیدا کېږي. دورې او غبار د ماشومانو پر گوتو او هغو شیانو کېني چې هغوی یې خولې ته وړي. هغه کورونه چې له 1978 کال څخه مخکې جوړ شوي دي، کېدای شي چې په رنگ کې یې سرپ موجود وي. دلته هغه کارونه دي چې په سرپو له مسمومېدو څخه د مخنیوي لپاره یې ترسره کولای شئ:

ساتل

- د رنگ ماتوالی، را پټ کېدل، درزونه یا خوړندوالی وگورئ.
- کړکې په ښه توګه کېږدئ تر څو د پاکولو لپاره سطحه هواره وي.
- د سرپو د خونديتوب کاري اقدامات ترسره کړئ - لکه په لمدو توتو پاکول او په لاندو برس پاکول.



پاکول

- یوازې له داسې برېښنايي جارو څخه کار واخلئ چې HEPA فلتر لري او ورو یې کشوئ.
- غولي لاندو کړئ او د کړکېو او سطحو لپاره له مرطوبو یو ځل کاریدونکو دستمالونو څخه ګټه واخلئ.
- بوتان په دروازه کې پرېږدئ تر څو هغه خاوره ورسره را نه وړي چې په ترکیب کې یې سرپ دی.
- ځینې وختونه د ماشومانو د لوبو وسایلو پرېمېنځ تر څو د سرپو هغه دوره تری لري شي چې په سترگو نه لیدل کېږي.



سالم خواړه وخورئ

- ماشومانو ته مېوه، سبزي او لښي محصولات ورکړئ، همدارنګه هغه خواړه چې اوسپنه ولري.
- سبزي او نور د خوړو باغونه په هغو خاورو کې وکړئ چې سرپ پکې نه وي.
- ځینې وختونه د ماشومانو لاسونه وښکئ، په ځانګړې توګه له ډوډۍ خوړلو، د ورځې ویده کېدو او شپې مهال ویده کېدو څخه مخکې.
- ناشتی او خواړه ماشومانو ته په مېزونو او د هغوی په لوړو څوکیو کې ورکړئ.



د سرپو نورې سرچینې وگورئ

سرپ همدارنګه په خاوره، اوبو او د کیلي ګانو، د ماشومانو د لوبو وسایلو او نورو انټیک شیانو په څېر محصولاتو کې وموندل شي.

- د څښلو اوبه مو معاینه کړئ چې سرپ ونلري. نور معلومات ترلاسه کړئ: healthvermont.gov/water/lead
- د پخلي، څښلو او وچو شیدو د جوړولو لپاره اوبه تر هغې پورې و بهوئ چې سرې راشي.
- ماشومان سرکونو ته نږدې پرته او په زړو کورونو کې له لوبو کولو څخه منع کړئ.
- ماشومان مه پرېږدئ چې په اوسپنیزو کیلي ګانو لوبې وکړي.
- خواړه په سرخلاصو قوطیو یا څټینو لوبښو کې مه ږدئ.
- ماشومان له مشخصو بوختیاوو څخه لرې وساتئ لکه د مردکیو جوړول یا رنگه ښیښي.
- له هغو محصولاتو څخه خبر اوسئ چې د مصرفوونکي د محصول د خونديتوب د کمیسیون له لوري را ټول شوي وي (www.cpsc.gov).



State law requires that all Vermont children are tested for lead at age 1 and again at age 2

There is no safe level of lead in the body. A child can be hurt by lead and still look healthy. Lead can harm a child's growth, behavior, and ability to learn. The only way to find out if your child has been exposed to lead is with a blood test.

Children are usually first tested with a capillary test – a small amount of blood taken from a finger, heel or toe – at their 1- and 2-year-old well child visits.

If lead is detected in your child's blood, they may need to be monitored or the result may need to be checked again with a venous test. This test uses blood from a vein (often in the arm). The venous test result is more accurate.

What can you do?

- Getting your child tested for lead is the first step. You did this!
- Schedule a venous test if your child's level is 3.5 µg/dL (micrograms per deciliter) or higher.
- No matter what your child's blood lead level is, learn how to protect your child from being exposed to lead. Visit healthvermont.gov/lead or call the Healthy Homes Lead Poisoning Prevention Program at 802-863-7220 or 800-439-8550.

Capillary Blood Lead Result	When to confirm with a venous blood test	
No detected lead (DL)	No Confirmation needed. There is no detected lead in your child's blood.	
DL – 3.4 µg/dL	Monitor over the next 6 months with another test. There is very little lead in your child's blood. Review sources of lead to keep your child's lead level from rising.	
3.5 – 9 µg/dL	1 month to 3 months. If confirmed, your child has more lead than most children. Take steps to reduce sources of lead. The Health Department will contact you to help you find sources of lead.	
10 – 44 µg/dL	2 weeks to 1 month. If confirmed, your child's lead level is high. You and your doctor should act quickly to reduce sources of lead and discuss your child's diet, growth and development. The Health Department can visit your home to help you find where lead may be coming from.	
45 – 59 µg/dL	48 hours	If confirmed, your child will need medical treatment right away. Consult with your doctor and reduce lead sources immediately. The Health Department can visit your home to help you find where lead may be coming from.
60+ µg/dL	Immediately	
The higher the capillary test result, the more urgent the need to confirm with a venous test.		
Your child's test result _____ µg/dL Date _____		

How to Protect Your Child From Lead

In Vermont, most lead poisoning comes from swallowing invisible lead dust that comes from peeling and chipping paint. The dust clings to fingers and objects that children put in their mouths. Houses built before 1978 likely have lead paint. Here's what you can do prevent lead poisoning:



Maintain

- Check for chipping, peeling, cracked or disturbed paint.
- Install window well inserts to provide a smooth cleaning surface.
- Use lead-safe work practices – such as wet sanding and wet scraping.



Clean

- Use only a vacuum with a HEPA filter, and vacuum slowly.
- Wet mop floors and use wet disposable towels on windowsills and surfaces.
- Leave shoes at the door to avoid tracking in soil that contains lead.
- Wash children's toys often to remove invisible lead dust.



Eat healthy

- Serve children fruits, vegetables and dairy products, as well as iron-rich foods.
- Plant vegetable and other food gardens in lead-free soil.
- Wash children's hands often, especially before meals, naps and bedtime.
- Serve snacks and meals to children at the table or in their highchairs.

Watch out for other sources of lead

Lead can also be found in soil, water, and products, such as keys, toys, and antiques.



- Have your drinking water tested for lead. Learn more: healthvermont.gov/water/lead
- Run water until cold for cooking, drinking and making formula.
- Keep children from playing in bare soil near roadways and older houses.
- Do not let children play with metal keys.
- Do not store food in open cans or pottery.
- Keep children away from certain hobbies, like making bullets or stained glass.
- Be aware of products that have been recalled by the Consumer Product Safety Commission (www.cpsc.gov).