

إحم طفلك من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي الحاد (RSV) كانون الثاني (يناير) ، 2025

فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) هو فيروس شائع يصيب الرئتين. يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال الرضع وكبار السن. إنه السبب الرئيسي لدخول الأطفال الرضع إلى المستشفى. لحسن الحظ، هناك خياران لحماية الأطفال من الـ RSV الحاد، ويحتاج معظم الأطفال إلى واحدٍ فقط: لقاح RSV الذي يُعطى للأم أثناء الحمل، أو الجسم المضاد لـ RSV، المعروف باسم نيرسيفيماب (nirsevimab)، والذي يُعطى للرضيع. قد يكون طفلك حديث الولادة مؤهلاً لتلقي نيرسيفيماب في المستشفى بعد الولادة، حيث يوفر حماية فورية ضد الـ RSV تدوم لمدة لا تقل عن خمسة أشهر. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للوصول إلى هذه المعلومات أو فهمها، يرجى التواصل على

نيرسيفيماب فعال بنسبة 90% في تجنّب دخول الأطفال الرضع إلى المستشفى بسبب فيروس RSV الحاد.

ahs.vdhimmunizationprogram@vermont.gov

حقائق عن الـ RSV

- يبدأ موسم فيروس RSV في الخريف ويبلغ ذروته في الشتاء.
- ينتقل عبر الرذاذ الناتج عن سعال أو عطس الشخص المصاب، أو من خلال الإتصال المباشر مع شخص يحمل فيروس RSV، أو عن طريق لمس سطح ملوث.
- لا تظهر على العديد من البالغين المصابين بفيروس RSV أي أعراض. أما أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض فهي عادة ما تكون خفيفة وأشبه بنزلات البرد (الزكام).
- في معظم الحالات، دائمًا ما يُظهر الأطفال الصغار جدًا أعراضًا عند إصابتهم بالـ RSV. تشمل هذه الأعراض الإنزاعاج، قلة النشاط، شرب أو تناول كميات أقل من الطعام، وانقطاع النّفس (توقف التنفس مؤقتًا لأكثر من 10 ثوانٍ)
- يمكن أن يسبب فيروس RSV مرضًا شديدًا في الرضع والأطفال الصغار مثل إلتهاب الشعب الهوائية (إلتهاب الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين) أو الإلتهاب الرئوي (مرض ذات الرئة).



الجسم المضاد لـ RSV (نيرسيفيماب – Nirsevimab)

- يتم إعطاء الجسم المضاد لفيروس RSV كجرعة واحدة.
- يُوصى به للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر ولم يحصلوا على الحماية من خلال لقاح RSV الذي يُعطى للأم. يتم إعطاء الجرعة للأطفال الرضع في الأشهر الممتدة من تشرين الأوّل (أكتوبر) إلى آذار (مارس).
- عادةً ما تكون الآثار الجانبية خفيفة وتزول بسرعة.



HealthVermont.gov/RSV
802-863-7200

 VERMONT
DEPARTMENT OF HEALTH