

**Departamento de Saúde de Vermont
Segunda Dose de Imunização da COVID-19
Formulário de Consentimento**

Nome do paciente: _____ Data de nascimento: _____

Publicado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC):

Intercambialidade dos produtos de vacina da COVID-19

Qualquer vacina da COVID-19 autorizada pela FDA pode ser usada quando indicada; a ACIP não indica uma preferência por produto. Porém, as vacinas da COVID-19 **não** são intercambiáveis. A segurança e a eficácia de uma série com produtos mistos não foram avaliadas. O mesmo produto deve ser administrado em ambas as doses da série.

Em situações excepcionais nas quais o produto da vacina com RNAm administrado na primeira dose não pode ser determinado ou não está mais disponível, qualquer vacina da COVID-19 com RNAm disponível pode ser administrada com um intervalo mínimo de 28 dias entre as doses para completar a série de vacinação da COVID-19 com RNAm. Em situações nas quais o mesmo produto de vacina com RNAm está temporariamente indisponível, é preferível adiar a segunda dose (até 6 semanas) para receber o mesmo produto do que receber uma série mista utilizando um produto diferente. Se duas doses de diferentes produtos de vacina da COVID-19 com RNAm forem administradas nestas situações (ou inadvertidamente), nenhuma dose adicional de qualquer um dos produtos é recomendada neste momento. Tais pessoas são consideradas totalmente vacinadas contra a COVID-19 duas semanas após o recebimento da segunda dose de uma vacina com RNAm.

A segurança e a eficácia da vacina Janssen da COVID-19 administrada após uma vacina da COVID-19 com RNAm ainda não foram estabelecidas. Entretanto, em situações limitadas e excepcionais em que um paciente recebeu a primeira dose de uma vacina contra COVID-19 com RNAm mas não consegue completar a série com a mesma ou outra vacina da COVID-19 com RNAm (por exemplo, devido a contraindicação), uma única dose da vacina Janssen para COVID-19 pode ser considerada com um intervalo mínimo de 28 dias a partir da dose da vacina da COVID-19 com RNAm. Os pacientes que recebem a vacina Janssen para COVID-19 após uma dose de uma vacina da COVID-19 com RNAm devem ser considerados como tendo recebido uma vacina Janssen válida, de dose única (não uma série de vacinação mista) e são considerados totalmente vacinados contra a COVID-19 duas semanas após o recebimento da dose única da vacina Janssen.

- **Informe à equipe clínica o que acredito ser o verdadeiro e exato produto de vacina da COVID-19 que eu recebi (ou o paciente acima recebeu) como primeira dose (ou seja, Pfizer-BioNTech, Moderna).**
- **Informe à equipe clínica o que acredito ser a data verdadeira e exata em que eu recebi (ou o paciente acima recebeu) a primeira dose da vacina contra a COVID-19.**
- **Entendo que o Departamento de Saúde de Vermont e esta clínica de vacinação não têm a possibilidade de verificar a exatidão da minha primeira dose (ou da do paciente acima) previamente recebida (ou seja, Pfizer-BioNTech, Moderna).**

Departamento de Saúde de Vermont
Segunda Dose de Imunização da COVID-19
Formulário de Consentimento

- Li os materiais acima dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) a respeito da intercambialidade dos produtos de vacina da COVID-19 que falam sobre a mudança do tipo de vacina recebido em uma segunda dose.
- Entendo que a segurança e a eficácia do recebimento de dois tipos diferentes de vacina da COVID-19 (por exemplo, receber Moderna em uma primeira dose e Pfizer-BioNTech na segunda dose) não foram estudadas nem determinadas.

Assinatura do paciente:

Data da assinatura do Formulário de Consentimento:

Assinatura do pai/mãe ou guardião legal* (se o paciente for menor de 18 anos)

*Se o menor estiver sob tutela do estado, é necessária a assinatura de um representante autorizado.

Nome do pai/mãe/guardião legal (em letras de forma): _____

Telefone diurno do pai/mãe/guardião legal:** _____

**Se o pai/mãe/guardião legal não estiver presente na clínica.