

重要提示：请务必回来接种第二剂疫苗。

- 您今天接种的疫苗还需要**第二剂接种**。如果您接种的是辉瑞（Pfizer）-BioNTech疫苗，请于17至21天内进行第二剂接种。如果您接种的是莫德纳（Moderna）疫苗，请于24至28天内进行第二剂接种。如果您错过了第二剂接种时间，请尽快进行接种。
- 如果您尚未预约第二剂接种，请尽快与您的疫苗提供者联系，安排预约。

您可能会出现疫苗所引起的副作用。

副作用属正常迹象，表明您的身体正在建立对抗COVID-19的保护。严重的副作用可能会影响您的日常活动，但数日后则会消失。

常见副作用有：

- 手臂注射部位疼痛、肿胀或发红
- 肌肉或关节疼痛
- 疲倦
- 发热
- 头痛
- 恶心或呕吐
- 畏寒

虽然罕见，但有些人在接种疫苗后可能会出现严重过敏反应。这就是美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议在接种COVID-19疫苗后对接种者进行监测的原因。

如何应对副作用：

- 如果副作用让您担忧或数日后并未消失，请致电您的医疗服务提供者或疫苗提供者。
- 您可以使用**V-safe**，向CDC告知出现的任何副作用，以及设定第二剂接种提醒。V-safe是一款可选的智能手机工具，该工具会利用短信和网络问卷调查的形式提供个性化的健康检查。如需了解更多信息或注册，请访问cdc.gov/vsafe。
- 如果您在接种疫苗后出现不良反应，则您或您的医疗服务提供者可以将其报告给**疫苗不良事件报告系统 (VAERS)**。致电1-800-822-7967或访问vaers.hhs.gov/reportevent.html。

继续采取预防措施，阻止COVID-19传播。

当前来讲，为了减缓COVID-19的传播，仍需要所有人继续利用可以加以使用的工具，例如佩戴口罩、

保持社交距离、勤洗手。切记，

- 接种任何疫苗后，您的身体还需要一定的时间来建立防护。第二次接种后的几周内，您可能还尚未获得针对COVID-19的防护效果。
- 在更改预防建议之前，专家需要更深入地了解COVID-19疫苗对这种冠状病毒的预防效果。

有关**COVID-19**的更多信息，请访问：www.healthvermont.gov/COVID-19