

## 重要須知：請務必回來接種第二劑疫苗。

- 您今天接種的疫苗，必需接種**第二劑**。若您接種了輝瑞-BioNTech疫苗，請在17-21天內接種第二劑。若您接種了莫德納疫苗，請在24-28天內接種第二劑。如果錯過了第二劑，請盡快安排接種。
- 如果您尚未預約接種第二劑，請聯絡您的疫苗提供者，盡快預約。

## 接種疫苗後可能出現副作用

副作用是正常現象，證明身體正在建立抵禦COVID-19的能力。副作用有機會影響您的日常活動，但應在數天內消失。

常見副作用包括：

- 接種疫苗後該處手臂疼痛、腫脹或發紅
- 疲累
- 頭痛
- 發冷
- 肌肉或關節痛
- 發燒
- 噁心或嘔吐

少部分人可能在接種疫苗後，出現嚴重過敏反應。因此疾病管制與預防中心建議，接種者在注射COVID-19疫苗後，接受觀察。

## 出現副作用後應做事項：

- 如對副作用感到憂慮，或副作用數天後仍然未消失，請您致電醫療保健或疫苗供應者。
- 您可以通過**V-safe**，將任何副作用告知CDC，並獲得接種第二劑疫苗的提示。作為可自選使用的智能手機工具，v-safe會以短訊和網上調查，為您提供個人化的跟進檢查。請到[cdc.gov/vsafe](https://cdc.gov/vsafe)登記和了解更多。
- 如果您在接種疫苗後出現不良反應，您或您的醫療保健提供者可以報告給**疫苗不良事件報告系統(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)**。致電1-800-822-7967或瀏覽[vaers.hhs.gov/reportevent.html](https://vaers.hhs.gov/reportevent.html)。

## 繼續遵守健康指引以防傳播COVID-19。

大家必須繼續遵守所有可減慢COVID-19傳播的手段，例如戴口罩、保持社交距離和勤洗手。請謹記，

- 接種任何疫苗後，身體需時建立抵抗力。第二次接種後的數周內，您可能仍未有抵抗COVID-19的能力。
- 在更改預防建議之前，專家需要更一步掌握COVID-19疫苗如何保護我們免受冠狀病毒感染。

要了解更多關於**COVID-19**的資訊，請登上[www.healthvermont.gov/COVID-19](https://www.healthvermont.gov/COVID-19)