

## إعادة فتح أبواب عيادات إعطاء لقاح جونسون أند جونسون في ولاية فيرمونت

بناءً على النتائج التي توصلت إليها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن خطر الإصابة بالجلطات الدموية نادرًا للغاية

برلينجتون، فيرمونت - أعلنت إدارة الصحة بولاية فيرمونت أنها ستستأنف استخدام لقاحات جونسون أند جونسون. وقد أُخذ القرار عقب الإعلان الصادر عن إدارة الغذاء والدواء ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن لجنته الاستشارية قد ثبت لديها أن استخدام اللقاح آمن وفعال، وأنه يمكن إنهاء فترة الإيقاف المؤقت التي فرضت من يوم ١٣ أبريل.

وقد صرّح مفوض الصحة الدكتور مارك ليفين قائلاً: "يسعدنا إتاحة هذا اللقاح مرة أخرى لحماية سكان فيرمونت من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)". وأضاف قائلاً، "أحث كل شخص مُستحق تلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن باستخدام أي لقاح متاح ومناسب له".

بإمكان سكان فيرمونت الذين يبلغون من العمر ١٨ عامًا أو أكبر التسجيل الآن لدى العيادات التي توفر لقاح جونسون أند جونسون المكون من جرعة واحدة، للتسجيل وحجز موعد، تفضل بزيارة [healthvermont.gov/MyVaccine](https://healthvermont.gov/MyVaccine). إذا احتجت إلى مساعدة، فاتصل بالرقم 855-722-7878 واضغط على الرقم 1 للحصول على خدمات الترجمة الفورية. سكان فيرمونت الذين يبلغون من العمر 16 و17 عامًا مؤهلون لتلقي لقاح فايزر فقط.

وقد صرّح د. ليفين قائلاً: "بينما كانت فترة الانقطاع مؤسفة، لكن ضمان أمان اللقاح يقع على قائمة أولوياتنا". وأضاف، "من منظور الصحة العامة، كانت الإجراءات التي اتخذت للإيقاف المؤقت وإجراء الدراسات مناسبة تمامًا - هذا هو الجانب التطبيقي من العلم. نحن مسؤولون عن ضمان ثقة الناس في هذا اللقاح، وجميع اللقاحات".

انضمت فيرمونت إلى معظم الولايات الأخرى في قرار الإيقاف المؤقت لاستخدام اللقاح بناءً على توصية مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها عقب بضعة بلاغات بإصابة متلقي اللقاح بالجلطات الدموية. وقد أعلن مسؤولو الصحة الفيدراليون قرار الإيقاف المؤقت لإتاحة الوقت للجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها لمراجعة البيانات الإضافية بشأن الآثار الجانبية المبلغ عنها.

وقال د. ليفين أنه أثناء فترة الإيقاف المؤقت، تم تزويد مقدمي الرعاية الصحية بولاية فيرمونت بالمعلومات والإرشادات حول أعراض الجلطات الدموية المحتملة والعلاج الطبي المناسب لها. وسوف يتواصل تزويدهم بما يستجد من هذه الإرشادات.

أعطي ما يقارب ٨ ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون في الولايات المتحدة. وقد تضمنت البلاغات التي أدت إلى الإيقاف المؤقت نوع نادر وحاد من الجلطات الدموية يُطلق عليه الخثار الجببي الوريدي المخي (CVST). وقد اكتُشفت الإصابات بعد مدة تصل إلى أسبوعين من تلقي اللقاح. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بهذه الأعراض الجانبية في ولاية فيرمونت.

بالرغم من أن [الآثار الجانبية](#) المعنية نادرة للغاية، أوصت إدارة الغذاء والدواء ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأشخاص الذين يتعرضون لنوبات حادة من الصداع أو المغص أو ألم الساق أو ضيق التنفس، خلال ثلاثة أسابيع بعد الحصول على لقاح جونسون أند جونسون، بالاتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور.